



## Allegato 1

### Prevenzione della malattia da Virus West Nile Lotta agli artropodi vettori

Si raccomanda alla popolazione, al fine di prevenire il rischio di trasmissione di WNV, di **proteggersi dalle punture di zanzare** tramite:

- **controllo** attivo del vettore **in aree private** (impiego di formulati insetticidi idonei all'uso domestico in campo civile, rimozione dei siti dove possono riprodursi le zanzare);
- adozione di misure individuali di protezione di seguito riportate:
  - all'aperto, utilizzare **repellenti cutanei per uso topico** registrati come Biocidi o come Presidi Medico Chirurgici, attenendosi alle norme indicate sui foglietti illustrativi, ponendo particolare attenzione al loro impiego su bambini, donne in gravidanza e in allattamento;
  - all'aperto, **indossare indumenti di colore chiaro** che coprano il corpo il più possibile (ad es. camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghe e calze);
  - in assenza di impianto di condizionamento d'aria, **utilizzare zanzariere ai letti**, alle **finestre** e alle **porte d'ingresso** avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;
  - nel solo caso di **presenza di zanzare in ambienti interni**, **vaporizzare spray a base di piretro** o di altri insetticidi per uso domestico, **oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici**, areando bene i locali prima di soggiornarvi.